

توصیه‌های بهداشتی برای پرورش زنبور عسل در فصل بهار



- ۱- تا حد امکان اقدام به جایگزینی پوک‌های مستعمل سال‌های پیش با ورق آج موم کنید.
- ۲- قبل از آغاز تخم‌ریزی ملکه، تا جایی که امکان دارد تعداد بیشتری از پوک‌های مستعمل سال گذشته را با ورق آج موم جایگزین کنید؛ زیرا برخی از بیماری‌های زنبور عسل از طریق موم از نسل زمستانه به نسل بهاره منتقل می‌شوند.
- ۳- کندوها را در مسیر رودخانه‌های فصلی یا مناطق آبگیر قرار ندهید. آن‌ها باید حدود ۳۰ سانتی‌متر بالاتر از سطح زمین قرار گیرند.
- ۴- مراقب باشید کندوها در معرض باد سرد قرار نگیرند.
- ۵- در صورت مشاهده‌ی علائم بیماری نوزما مانند زنبورهایی که روی زمین راه می‌روند و یا وجود لکه‌های کوچک مدفوع در جلوی کندو، روی کندو و یا قاب‌ها، برای تأیید تشخیص و مشورت لازم در باره‌ی کنترل بیماری، به دامپزشکان بخش خصوصی فعال در زمینه بیماری‌های زنبور عسل و یا ادارات دامپزشکی

مراجعه کنید. در این موارد، نمونه‌ای که باید از زنبورستان گرفته شود شامل تعداد ۲۰ زنبور پروازی از جلوی سوراخ پرواز هر کندو از تعدادی از کندوهای مشکوک است.

۶- پس از خروج کلنی‌ها از خوشه و پیش از آغاز تخم‌ریزی ملکه، بهترین زمان برای درمان بیماری واروا است. برای این کار از داروهای ثبت شده در سازمان دامپزشکی کشور، و کاملاً براساس مندرجات برچسب روی آن‌ها، استفاده کنید.

۷- کلنی‌های سرگردان یا بچه‌کندوهایی که اخیراً در اطراف زنبورستان گرفته شده‌اند را بلافاصله در زنبورستان قرار ندهید؛ زیرا ممکن است جمعیت زنبورهای آن‌ها ناقل بیماری لوک آمریکایی باشد. به این منظور کندو را در محلی دیگر قرار دهید و پس از تخم‌ریزی ملکه و مطمئن شدن از عدم وجود نشانه‌های بیماری، مانند سوراخ شدگی و فرورفتگی سر حجره‌ها، یکنواخت نبودن سطح تخم‌ریزی بر روی شان‌ها و...، آن‌ها را در محل زنبورستان مستقر کنید.

۸- تا حد امکان برای درست کردن خمیر شیرین یا جایگزین گرده، از عسل یا گرده‌ی گل تهیه شده از زنبورستان‌های دیگر استفاده نکنید و اگر ناگزیر به این کار شدید، حتماً از زنبورستان‌هایی که درگیر بیماری‌های نوزادان مانند لوک آمریکایی و لوک اروپایی نیستند، تهیه شود.

۹- کندوهای زنبور عسل را از غارت حفظ کنید. کلنی‌های ضعیف تقویت و یا ادغام شوند.

تهیه و تدوین: گروه آموزش، ترویج و پژوهش‌های کاربردی

منبع: دفتر مدیریت بهداشت و بیماری‌های طیور، زنبور عسل و کرم ابریشم

سازمان دامپزشکی کشور

